


A ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2021 – 2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ


1 (7969, 7990) Δυο κιβώτια A, B με ίσες μάζες βρίσκονται δίπλα-δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκούνται στα κιβώτια A, B σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F_A, F_B με μέτρα $F_A=F, F_B=\frac{1}{2}F$ αντίστοιχα,



όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Αν μετά από ίσες μετατοπίσεις από το σημείο εκκίνησης τους, τα κιβώτια A και B έχουν ταχύτητες με μέτρα v_A και v_B αντίστοιχα, τότε ισχύει:


(α) $v_A=v_B$ (β) $v_A=v_B\sqrt{2}$ (γ) $v_B=v_A\sqrt{2}$ (4+9)

2 (7970) Κιβώτιο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα η τιμή της οποίας δίδεται από τη σχέση $v=5t$ (SI). Στη διπλανή εικόνα παριστάνονται τρία διαγράμματα με τη τιμή δύναμης- χρόνου τα A, B και Γ. Το διάγραμμα που παριστάνει τη τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο είναι:



(α) το A (β) το Γ (γ) το B (4+9)

3 (7971) Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα. Το κιβώτιο αποκτά τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή :



(α) $t=10s$ (β) $t=15s$ (γ) $t=30s$ (4+8)

4 (7973) Δύο μικρές μεταλλικές σφαίρες (1), (2) αφήνονται ελεύθερες να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα από διαφορετικά ύψη. Η σφαίρα (1) αφήνεται από ύψος h_1 και για να φτάσει στο έδαφος χρειάζεται διπλάσιο χρόνο από τη σφαίρα (2) που αφήνεται από ύψος h_2 . Ο λόγος των υψών, από τα οποία αφέθηκαν να πέσουν οι σφαίρες είναι ίσος :

(α) $\frac{h_1}{h_2}=4$ (β) $\frac{h_1}{h_2}=2$ (γ) $\frac{h_1}{h_2}=\frac{1}{2}$ (4+9)

5 (7974) Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν διαδοχικά από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας με χρονική διαφορά ίση με 1s το ένα μετά το άλλο. Αν η επίδραση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) είναι σταθερή, τότε η διαφορά των ταχυτήτων των δύο σωμάτων για όσο χρόνο τα σώματα βρίσκονται σε πτώση:

(α) συνεχώς αυξάνεται (β) συνεχώς μειώνεται (γ) παραμένει σταθερή (4+9)

6 (7976) Μία σιδερένια συμπαγής σφαίρα (A) και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ (B) αφήνονται την ίδια χρονική στιγμή από το μπαλκόνι του 1^{ου} ορόφου ενός κτιρίου. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή, τότε:

(α) η σφαίρα (A) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα από το μπαλάκι, γιατί έχει μεγαλύτερη μάζα.

(β) το μπαλάκι (B) φτάνει στο έδαφος γρηγορότερα, γιατί έχει μικρότερη μάζα και συνεπώς θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτάχυνση.

(γ) τα δύο σώματα φτάνουν ταυτόχρονα γιατί ο λόγος $\frac{w}{m}$ δηλαδή ο λόγος του βάρους τους w προς τη μάζα τους m , είναι ίδιος και για τα δυο σώματα. (4+8)

7 (7977) Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης, είναι έξι φορές μικρότερο από αυτό στην επιφάνεια της Γης $g_{\Sigma} = \frac{1}{6} g_{\Gamma}$.


Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, για τους χρόνους πτώσης της μεταλλικής σφαίρας, που αφήνεται από ύψος 2,5m πάνω από την επιφάνεια της Γης και της Σελήνης αντίστοιχα, θα είναι:

(α) μεγαλύτερος στη Γη

(β) ίδιος στη Γη και στη Σελήνη

(γ) μεγαλύτερος στη Σελήνη. (4+8)

8 (7978) Δύο σώματα με μάζες m_1 και m_2 για τις οποίες ισχύει $m_1 > m_2$ βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και είναι σε επαφή μεταξύ τους. Μπορούμε να μετακινήσουμε τα σώματα, εφαρμόσουμε οριζόντια δύναμη ίσου μέτρου F , είτε στο σώμα m_1 με φορά προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στο σχήμα (α), είτε στο σώμα m_2 με φορά προς τα αριστερά όπως φαίνεται στο σχήμα (β).



Το μέτρο της επιτάχυνσης που αποκτούν τα δύο σώματα:

(α) είναι ίδιο και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις

(β) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση του σχήματος (α)

(γ) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση του σχήματος (β) (4+8)

9 (7986) Ένας μαθητής πετάει κατακόρυφα προς τα πάνω ένα μπαλάκι του τένις και το ξαναπιάνει στην ίδια θέση. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. Αν t_a είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανοδική κίνηση της μπάλας και t_k είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καθοδική κίνηση της μπάλας, τότε ισχύει:


(α) $t_a > t_k$

(β) $t_a = t_k$

(γ) $t_a < t_k$

(4+8)

10 (7986) Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια (συνισταμένη) δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα στη διπλανή εικόνα. Το κιβώτιο κινείται με:



- (α) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_1
 (β) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_2
 (γ) τη μέγιστη κατά μέτρο επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t_1 και τη μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα τη χρονική στιγμή t_2 (4+8)

11 (7991) Ένα φορτηγό και ένα ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου σε ευθύγραμμο, οριζόντιο δρόμο. Κάποια χρονική στιγμή οι οδηγοί τους εφαρμόζουν τα φρένα προκαλώντας και στα δύο οχήματα συνισταμένη δύναμη ίδιου μέτρου και αντίρροπη της ταχύτητάς τους. Το όχημα που θα διανύσει μεγαλύτερο διάστημα από τη στιγμή που άρχισε να επιβραδύνεται, μέχρι να σταματήσει είναι:

- (α) το φορτηγό
 (β) το ΙΧ επιβατηγό
 (γ) κανένα από τα δύο, αφού θα διανύσουν το ίδιο διάστημα. (4+9)

12 (7993) Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια Γης, Δία αντίστοιχα είναι $g_{\Gamma}=9,8\text{m/s}^2$ και $g_{\Delta}= 25,9 \text{ m/s}^2$. Οι δύο στήλες αναφέρονται στην ελκτική βαρυτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης Δίας σε αστροναύτη και στη μάζα του αστροναύτη, όταν είναι στην επιφάνειά του.

	Ελκτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης Δίας στον Αστροναύτη	Μάζα του αστροναύτη στον Πλανήτη Δία
(α)	Μεγαλύτερη, σε σχέση με την ελκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά της	Ίδια με αυτήν στη Γη
(β)	Μεγαλύτερη, σε σχέση με την ελκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά της	Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη
(γ)	Ίση με την ελκτική δύναμη που ασκείται στον αστροναύτη από τη Γη όταν βρίσκεται στην επιφάνειά της	Μεγαλύτερη από τη μάζα του στη Γη

(4+8)


13 (7994) Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης είναι 6,25 φορές μεγαλύτερο από το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην επιφάνεια της Σελήνης. Το βάρος ενός μεταλλικού κύβου, όπως μετράται με το ίδιο δυναμόμετρο, στη Γη είναι B_{Γ} και στην επιφάνεια της Σελήνης είναι B_{Σ} . Αν η επίδραση του αέρα, είναι αμελητέα για τα μέτρα των βαρών του κύβου ισχύει :

(α) $B_{\Gamma}=6,25B_{\Sigma}$ (β) $B_{\Sigma}=6,25B_{\Gamma}$ (γ) $B_{\Gamma}=B_{\Sigma}$ (4+8)

14 (7998) Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ_1 και Σ_2 , με μάζες m_1 και m_2 αντίστοιχα, με $m_2 > m_1$ αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης.


- (α) Το βάρος της Σ_2 είναι μεγαλύτερο από αυτό της Σ_1 και συνεπώς η Σ_2 κινείται με επιτάχυνση μεγαλύτερη από αυτήν της Σ_1 .
- (β) Οι δύο σφαίρες κινούνται με ίσες επιταχύνσεις και φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος έχοντας ίσες ταχύτητες.
- (γ) Η βαρύτερη σφαίρα φτάνει πρώτη στο έδαφος και με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ελαφρύτερη. (4+8)

15 (7999) Σε ένα κιβώτιο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, αρχίζει τη χρονική στιγμή $t=0$ να εφαρμόζεται μια οριζόντια δύναμη σταθερής κατεύθυνσης, το μέτρο της οποίας είναι σταθερό μέχρι τη στιγμή t_1 . Στη συνέχεια το μέτρο της δύναμης μειώνεται μέχρι που μηδενίζεται τη χρονική στιγμή t_2 , όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.



- (α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t_1 το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.
- (β) Μέχρι την στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και στην συνέχεια επιβραδυνόμενη κίνηση.
- (γ) Μετά από τον μηδενισμό της δύναμης το σώμα συνεχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα. (4+9)

16 (8000, 8026, 13550) Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη και το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά. Η γραφική παράσταση της τιμής της δύναμης που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (t) παριστάνεται σωστά από το διάγραμμα:




(4+8)

17 (8004) Ένας αστροναύτης επιχειρεί να μετρήσει την επιτάχυνση της βαρύτητας κοντά στην επιφάνεια ενός πλανήτη που δεν έχει ατμόσφαιρα. Για το σκοπό αυτό αφήνει να πέσει μια μικρή σφαίρα από ύψος 1,5m οπότε διαπιστώνει ότι η σφαίρα φτάνει στην επιφάνεια μετά από χρόνο 3s. Ο αστροναύτης βρίσκει το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι ίσο με:

- (α) 1m/s^2 (β) $\frac{1}{2}\text{m/s}^2$ (γ) $\frac{1}{3}\text{m/s}^2$ (4+8)

18 (8004) Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x . Τη χρονική στιγμή $t=3\text{s}$:



- (α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .
 (β) το κιβώτιο ηρεμεί
 (γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x . (4+9)

19 (8009) Κιβώτιο αρχίζει την $t=0$ να κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δάπεδο και η τιμή της ταχύτητας του δίδεται από τη σχέση $v=5t$ (SI). Η τιμή της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο:


- (α) ελαττώνεται με το χρόνο (β) αυξάνεται με το χρόνο (γ) παραμένει σταθερή (4+9)

20 (8012) Μία μεταλλική σφαίρα μικρών διαστάσεων αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ύψος h με αποτέλεσμα η ταχύτητα της ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος να έχει μέτρο ίσο με v . Θεωρήστε την επίδραση του αέρα αμελητέα και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) σταθερή. Για να έχει η ίδια σφαίρα ακριβώς πριν ακουμπήσει στο έδαφος ταχύτητα διπλάσιου μέτρου, τότε πρέπει να αφηθεί από ύψος: (α) $\sqrt{2}h$ (β) $\sqrt{2}h$ (γ) $4h$ (4+9)

21 (8014, 13547) Δύο σφαίρες A και B με ίσες μάζες αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από ύψος $\frac{1}{2}h$ και h , αντίστοιχα.

Εάν t_A και t_B είναι οι χρόνοι που χρειάζονται οι σφαίρες A και B αντίστοιχα, για να φτάσουν στο έδαφος, τότε ισχύει η σχέση:


- (α) $t_B=t_A$ (β) $t_B=2t_A$ (γ) $t_B=\sqrt{2}t_A$ (4+9)




22 (8016) Δύο πέτρες A, και B αφήνονται αντίστοιχα από τα ύψη h_A , h_B πάνω από το έδαφος να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση. Αν για τους χρόνους πτώσης μέχρι το έδαφος ισχύει η σχέση $t_A=2t_B$, τότε τα ύψη h_A και h_B ικανοποιούν τη σχέση:

- (α) $h_A=2h_B$ (β) $h_A=4h_B$ (γ) $h_A=8h_B$ (4+8)


23 (8016) Μία μεταλλική σφαίρα κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω και κατακόρυφα προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση, το μέτρο της οποίας είναι ίσο με a και στις δύο περιπτώσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην εικόνα παριστάνονται επίσης και οι δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα σε κάθε περίπτωση. Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει η σχέση:
 (α) $F_1 + F_2 = 2mg$ (β) $F_1 - F_2 = mg$ (γ) $F_1 + F_2 = mg$ (4+9)



24 (8018) Σε ένα σώμα μάζας m που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F , οπότε το σώμα αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με επιτάχυνση $a = 2g$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Αν η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα τότε το βάρος B του σώματος θα έχει μέτρο : (α) F (β) $\frac{1}{3}F$ (γ) $3F$ (4+9)



25 (8020) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της ταχύτητας του σε συνάρτηση με το χρόνο.



(α) Στο χρονικό διάστημα $(1 \rightarrow 2)s$ η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή,
 (β) Η ολική μετατόπιση του αυτοκινήτου είναι μηδέν.

(γ) Στο χρονικό διάστημα $(2 \rightarrow 3)s$ η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο είναι μηδέν. (4+8)

26 (8020) Ένα κιβώτιο μάζας $2kg$ ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F . Το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση




μέτρου $a = 1m/s^2$. Διπλασιάζουμε το μέτρο της δύναμης F οπότε το κιβώτιο ολισθαίνει με επιτάχυνση μέτρου ίσου με $3m/s^2$. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Το μέτρο της δύναμης F ισούται με : (α) $8N$ (β) $4N$ (γ) $6N$ (4+9)

27 (8021) Σε ένα κιβώτιο μάζας m που βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη F_1 και το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου a . Αν μαζί με την F_1 ασκούμε στο κιβώτιο και δεύτερη οριζόντια δύναμη F_2 με μέτρο $F_2 = \frac{1}{3}F_1$ και αντίθετης κατεύθυνσης από την F_1 τότε η επιτάχυνση με την οποία θα κινείται το κιβώτιο θα έχει μέτρο ίσο με :

(α) $\frac{1}{2}a$ (β) $\frac{2}{3}a$ (γ) $\frac{1}{3}a$ (4+9)

28 (8023) Μία σφαίρα όταν αφήνεται από μικρό ύψος h πάνω από την επιφάνεια της Γης, φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t_{Γ} . Η ίδια σφαίρα όταν αφήνεται από το ίδιο ύψος h πάνω από την επιφάνεια ενός πλανήτη A , φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη σε χρόνο $t_A=3t_{\Gamma}$. Η αντίσταση του αέρα στην επιφάνεια της Γης είναι αμελητέα, ενώ ο πλανήτης A δεν έχει ατμόσφαιρα. Αν g_{Γ} και g_A είναι οι επιταχύνσεις της βαρύτητας στη Γη και στον πλανήτη A αντίστοιχα, τότε ισχύει: (α) $g_A=\frac{1}{9}g_{\Gamma}$ (β) $g_A=\frac{1}{3}g_{\Gamma}$ (γ) $g_{\Gamma}=\frac{1}{9}g_A$ (4+8)

29 (8025) Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x . Τη χρονική στιγμή $t=3s$ το κιβώτιο :




(α) ηρεμεί.

(β) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x

(γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x .

(4+9)

30 (8026) Κιβώτιο βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη η τιμή της οποίας σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διάγραμμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα, οπότε το κιβώτιο αρχίζει να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x . Τη χρονική στιγμή $t=3s$:



(α) το κιβώτιο εξακολουθεί να κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x .

(β) το κιβώτιο ηρεμεί

(γ) το κιβώτιο κινείται κατά την αρνητική φορά του άξονα x .

(4+9)

31 (8029) Σφαίρα που κινείται κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους της βρίσκεται τη χρονική στιγμή $t=0$ στο σημείο O . αν τη χρονική στιγμή $t=2s$ η σφαίρα βρίσκεται $10m$ κάτω από το O και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $g=10m/s^2$ τότε η σφαίρα τη χρονική στιγμή $t=0$:

(α) κινούνταν προς τα πάνω.

(β) κινούνταν προς τα κάτω.

(γ) αφέθηκε ελεύθερη χωρίς αρχική ταχύτητα.

(4+9)

32 (8030) Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F_1 με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο ανεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου $\frac{1}{2}g$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Όταν ο γερανός κατεβάζει το ίδιο κιβώτιο ασκώντας σε αυτό κατακόρυφη δύναμη F_2 το κιβώτιο κατεβαίνει με επιτάχυνση $\frac{1}{2}g$. Αν στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση ασκούνται δύο δυνάμεις, η δύναμη του βάρους και αυτή από το γερανό τότε για τα μέτρα τους θα ισχύει :

(α) $F_1=F_2$

(β) $F_1=3F_2$

(γ) $F_1=2F_2$

(4+9)

33 (8031) Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F με την επίδραση της οποίας το κιβώτιο κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου $\frac{1}{2}g$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο F της δύναμης F και το μέτρο B του βάρους του κιβωτίου ισχύει :

(α) $F = \frac{1}{2}B$ (β) $F = 2B$ (γ) $F = B$ (4+8)

34 (8032) Γερανός ασκεί σε κιβώτιο κατακόρυφη δύναμη F ώστε το κιβώτιο κατεβαίνει κατακόρυφα με επιτάχυνση μέτρου $\frac{1}{3}g$, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, τότε για το μέτρο της δύναμης F και το μέτρο B του βάρους του κιβωτίου ισχύει :

(α) $F = \frac{1}{3}B$ (β) $F = \frac{4}{3}B$ (γ) $F = \frac{2}{3}B$ (4+8)

35 (8033) Ένα παιγνίδι-αυτοκινητάκι μάζας 1Kg είναι ακίνητο στη θέση $x=0$. Την χρονική στιγμή $t=0$ ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με τον χρόνο.

t(s)	x(m)
0	0
1	1
2	4
3	9

(α) το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4m/s^2 .

(β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή $t=2\text{s}$ έχει ταχύτητα μέτρου $v=4\text{m/s}$.

(γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1N . (4+8)

36 (8035) Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο κιβώτιο ασκούνται δυο σταθερές οριζόντιες αντίρροπες δυνάμεις F_1 και F_2 με αποτέλεσμα



το κιβώτιο να κινείται με επιτάχυνση a ομόρροπη της F_1 . Αν καταργηθεί η F_2 η επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο έχει διπλάσιο μέτρο χωρίς να αλλάξει φορά. Τότε τα μέτρα των δυνάμεων F_1 και F_2 συνδέονται με τη σχέση :

(α) $F_1 = 2F_2$ (β) $F_2 = 2F_1$ (γ) $F_1 = 3F_2$ (4+9)


37 (8036) Καθώς ο Μάριος περπατούσε από το σχολείο προς το σπίτι του, είδε έναν ελαιοχρωματιστή να στέκεται σε μια ψηλή σκαλωσιά και να βάφει ένα τοίχο. Κατά λάθος, ο ελαιοχρωματιστής έσπρωξε τον κουβά με την μπογιά (μάζας 10Kg) και τη βούρτσα (μάζας $0,5\text{Kg}$). Τα δύο αντικείμενα έπεσαν στο έδαφος ταυτόχρονα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

(α) Η δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στον κουβά με την μπογιά έχει μεγαλύτερο μέτρο από τη δύναμη της βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα.

(β) Αφού τα δύο αντικείμενα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, το μέτρο της δύναμης όπως βαρύτητας που ασκείται στο κάθε ένα θα πρέπει να είναι το ίδιο.

(γ) Η δύναμη όπως βαρύτητας που ασκείται στη βούρτσα έχει μεγαλύτερο μέτρο ώστε να κινείται με τον ίδιο τρόπο όπως ο κουβάς. (4+8)

38 (8037) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιασθεί τα διαγράμματα A και B της τιμής της ταχύτητας δυο σωμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα σώματα κινούνται σε παράλληλες και οριζόντιες ευθύγραμμες τροχιές. Επομένως :



(α) τα μέτρα των επιταχύνσεων των δύο σωμάτων ικανοποιούν τη σχέση $a_B=2a_A$

(β) αν τα δύο αυτοκίνητα έχουν ίσες μάζες τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο πρώτο (A) είναι ίση με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο δεύτερο (B).

(γ) αν S_A το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο (A) στο χρονικό διάστημα $0 \rightarrow t_1$ και S_B το διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο (B) στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ισχύει $S_A=4S_B$ (4+8)


39 (8038) Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του δρόμου, στον οποίο κινείται, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνεται μέχρι να σταματήσει. Στη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης:

(α) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.

(β) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.

(γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου. (4+8)


40 (8039) Δύο μικροί κύβοι Σ_1 και Σ_2 με μάζες m_1 και m_2 με $m_2=2m_1$ είναι αρχικά ακίνητοι πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και απέχουν απόσταση d . Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκούμε ταυτόχρονα



δυο οριζόντιες σταθερές δυνάμεις F_1 στο κύβο Σ_1 και F_2 στο κύβο Σ_2 με αποτέλεσμα αυτοί να κινηθούν πάνω στην ίδια ευθεία σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αν οι κύβοι συναντώνται στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης για τα μέτρα των δυνάμεων F_1 και F_2 θα ισχύει :

(α) $F_1=2F_2$ (β) $F_1=F_2$ (γ) $F_2=2F_1$ (4+8)

41 (8040) Ένα κιβώτιο είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή $t=0$ ασκείται οριζόντια δύναμη F . Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η τιμή της δύναμης F σε συνάρτηση με το χρόνο, οπότε:




(α) Μέχρι την χρονική στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

(β) Μέχρι την χρονική στιγμή t_1 το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μετά ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

(γ) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την χρονική στιγμή t_2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της ταχύτητας την στιγμή t_1 (4+8)

42 (8045) Ένας μικρός κύβος βρίσκεται ακίνητος πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Την στιγμή $t=0$ αρχίζει να ασκείται στον κύβο οριζόντια δύναμη F σταθερής κατεύθυνσης της οποίας το μέτρο μεταβάλλεται με το χρόνο όπως παριστάνεται στο διάγραμμα. Η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί ο κύβος θα έχει.




- (α) σταθερό μέτρο και μεταβαλλόμενη κατεύθυνση.
 (β) μέτρο που αυξάνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση
 (γ) μέτρο που μειώνεται με το χρόνο και σταθερή κατεύθυνση. (4+8)

43 (8046) Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο έχοντας σταθερή ταχύτητα μέτρου v_0 . Ο οδηγός του τη χρονική στιγμή $t=0$ φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιβράδυνση. Το αυτοκίνητο σταματά τη χρονική στιγμή t_1 , έχοντας διανύσει διάστημα S_1 . Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα μέτρου $2v_0$ σταματά τη χρονική στιγμή t_2 έχοντας διανύσει διάστημα S_2 . Αν η συνιστάμενη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο και στις δυο περιπτώσεις είναι ίδια τότε θα ισχύει:

- (α) $S_2=2S_1$ (β) $t_2=2t_1$ (γ) $t_1=2t_2$ (4+9)

44 (8047) Τρεις σκληρές ατσάλινες μπίλιες Α, Β, Γ κινούνται ευθύγραμμα σε λείο δάπεδο. Για κάθε μία από αυτές δίνεται μια γραφική παράσταση ενός μεγέθους που χαρακτηρίζει την κίνηση τους.



Μικρό σώμα Δ κινείται ευθύγραμμα σε λείο οριζόντιο δάπεδο και η μετατόπιση του είναι ανάλογη του χρόνου.

Μεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρώνοντας την αντίστοιχη στήλη με (ΝΑΙ) αν απαιτείται δράση οριζόντιας δύναμης για να προκύψει η κίνηση του σώματος ή με (ΟΧΙ) σε αντίθετη περίπτωση αιτιολογώντας τις επιλογές σας.

ΣΩΜΑ	δράση δύναμης
A	
B	
Γ	
Δ	

(4+9)

45 (8048) Μικρός κύβος κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στον κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F κατά τη διεύθυνση της κίνησης του για χρονικό διάστημα $12s$ οπότε αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας του κύβου κατά $6m/s$. Αν στον ίδιο κύβο ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη κατά τη διεύθυνση της κίνησης του μέτρου $2F$ τότε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αλλάξει η ταχύτητα του κύβου από $6m/s$ σε $8m/s$ είναι:

- (α) $12s$ (β) $6s$ (γ) $2s$ (4+8)

46 (8050) Σε μια στιγμή απροσεξίας ξεφεύγει το σφυρί από τα χέρια κάποιου εργάτη που δουλεύει στην ταράτσα ενός πολυώροφου κτιρίου. Ένα δευτερόλεπτο (1s) αργότερα το σφυρί βρίσκεται έναν όροφο πιο κάτω από την ταράτσα του κτηρίου. Αν θεωρήσετε την επίδραση του αέρα αμελητέα, την επιτάχυνση της βαρύτητας σταθερή και την υψομετρική διαφορά των διαδοχικών ορόφων ίδια τότε έπειτα από ένα ακόμη δευτερόλεπτο το σφυρί θα βρίσκεται πιο κάτω σε σχέση με την ταράτσα:

(α) τέσσερις ορόφους. (β) δύο ορόφους. (γ) τρεις ορόφους. (4+9)

47 (8051) Δύο αυτοκίνητα με μάζες $m_A=4000\text{Kg}$ και $m_B=1000\text{Kg}$ είναι αρχικά ακίνητα σε οριζόντιο δρόμο. Τα αυτοκίνητα αρχίζουν να κινούνται στο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στα δυο αυτοκίνητα έχει το ίδιο μέτρο. Όταν τα αυτοκίνητα έχουν διανύσει απόσταση x κινούνται με ταχύτητες μέτρου v_A και v_B αντίστοιχα για τα οποία ισχύει:

(α) $v_A=v_B$ (β) $2v_A=v_B$ (γ) $v_A=2v_B$ (4+8)


48 (8051) Παιδικό αμαξάκι έχει μάζα $m=1\text{Kg}$ και κινείται σε οριζόντιο δάπεδο. Στο αμαξάκι ασκείται τη χρονική στιγμή $t=0$ οριζόντια δύναμη μέτρου $F=8\text{N}$.

Η γραφική παράσταση της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με τον χρόνο δίνεται στο διπλανό σχήμα. Δυο μαθητές A και B συζητούν

για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπολογίσουν την επιτάχυνση του. Ο μαθητής A σκέφτεται να υπολογίσει την επιτάχυνση από τη γραφική παράσταση ενώ ο B από το λόγο $\frac{F}{m}$, οπότε Το σωστό τρόπο υπολογισμού της επιτάχυνσης έχει σκεφθεί:

(α) ο μαθητής A (β) ο μαθητής B (γ) και οι δυο (4+9)

49 (8052) Δύο μικρά σώματα A και B διαφορετικών μαζών, βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το A είναι ακίνητο ενώ το B κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u_1 . Κάποια στιγμή ασκούμε την ίδια οριζόντια δύναμη (προς την κατεύθυνση της ταχύτητας u_1) και στα δυο σώματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου μέτρου. Για τις μάζες των σωμάτων θα ισχύει: (α) $m_A < m_B$ (β) $m_A > m_B$ (γ) $m_A = m_B$ (4+8)



50 (8054) Σώμα βάρους 10N βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο πάτωμα. Στο σώμα αρχίζει να ασκείται κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα πάνω, το μέτρο της οποίας αυξάνεται. Στην πρώτη στήλη του διπλανού πίνακα φαίνονται κάποιες τιμές της δύναμης F καθώς αυξάνεται. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε στη δεύτερη στήλη το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής N , που ασκείται στο σώμα από το πάτωμα.


F	N
0	
2	
6	
10	

(4+8)

51 (12005) Στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής Α Λυκείου δύο μαθητές ο Α και ο Β εκτελούν τις εξής δραστηριότητες :

Ο μαθητής Α τραβά απότομα το γυαλιστερό χαρτόνι, που σκεπάζει ένα ποτήρι, επάνω στο οποίο ισορροπεί ένα νόμισμα (εικόνα 1).

Ο μαθητής Β τραβά απότομα το γυαλιστερό χαρτόνι, το οποίο βρίσκεται επάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο και επάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο και επάνω στο χαρτόνι ισορροπεί ένα νόμισμα (εικόνα 2)



Εικόνα 1



Εικόνα 2

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δύο μαθητών θα είναι :

(α) και στις δύο δραστηριότητες το νόμισμα κινείται μαζί με το χαρτόνι.

(β) στη δραστηριότητα του μαθητή Α το νόμισμα πέφτει μέσα στο ποτήρι ενώ στη δραστηριότητα του μαθητή Β το νόμισμα ακολουθεί το χαρτόνι.


(γ) στη δραστηριότητα του μαθητή Α το νόμισμα πέφτει μέσα στο ποτήρι ενώ στη δραστηριότητα του μαθητή Β το νόμισμα παραμένει ακίνητο στην αρχική του θέση επάνω στο οριζόντιο δάπεδο. (4+9)

52 (12005) Από μικρό ύψος h από την επιφάνεια της γης, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g_0 , αφήνουμε να πέσει ένα σφαιρίδιο. Από το ίδιο ύψος h από την επιφάνεια άλλου πλανήτη όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι $\frac{1}{4}g_0$

αφήνουμε να πέσει επίσης ένα σφαιρίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις θεωρούμε ότι η μοναδική δύναμη η οποία ασκείται στο κάθε σώμα είναι το βάρος του. Αν u_1 είναι το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φτάνει το σφαιρίδιο στην επιφάνεια της γης και u_2 είναι το μέτρο της ταχύτητας με την οποία φτάνει το σφαιρίδιο στην επιφάνεια του άλλου πλανήτη τότε θα ισχύει :

(α) $u_1=2u_2$ (β) $u_2=2u_1$ (γ) $u_1=u_2$ (4+8)


53 (12016) Ένα σώμα (αμελητέων διαστάσεων) αφήνεται ελεύθερο από ύψος $h=2m$ πάνω από την επιφάνεια της γης κάποια χρονική στιγμή ($t_0=0$). Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας u του σώματος μεταβάλλεται με το χρόνο όπως το διάγραμμα του διπλανού σχήματος. Εξηγήστε (αιτιολογώντας) αν η κίνηση του σώματος είναι ελεύθερη πτώση.




(4+8)

επιτάχυνση βαρύτητας $g=10m/s^2$

54 (12053) Ένα σώμα βάρους B κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο υπό την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Αν N είναι το μέτρο της κάθετης αντίδρασης από το έδαφος και T το μέτρο της τριβής ολίσθησης, η σχέση των μέτρων των δυνάμεων είναι : (α) $F > T, N = B$ (β) $F = T, N = B$ (γ) $F > T, N < B$ (4+8)



55 (12053) Κιβώτιο βάρους B , που θεωρούμε υλικό σημείο, κρέμεται κατακόρυφα με τη βοήθεια νήματος στο άκρο του οποίου ασκείται δύναμη F με φορά προς τα πάνω. Η σταθερή επιτάχυνση με την οποία κιβώτιο κινούνται προς τα πάνω είναι $0,2g$ με g το μέτρο επιτάχυνσης της βαρύτητας. Το μέτρο της F είναι :



(α) ίσο με το μέτρο του βάρους ($F = B$).

(β) $1,2$ του μέτρου του βάρους ($F = 1,2B$).

(γ) $0,2$ του μέτρου του βάρους ($F = 0,2B$).

(4+9)

56 (12317) Από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας αφήνεται να πέσει μια ξύλινη σφαίρα μάζας m και ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει από το μπαλκόνι του 2^{ου} ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας σιδερένια σφαίρα διπλάσιας μάζας $2m$. Γνωρίζετε ότι το ύψος πτώσης της ξύλινης σφαίρας είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό της σιδερένιας σφαίρας. Η επίδραση του αέρα θεωρείται αμελητέα και επομένως οι δύο σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση.

(I) Αν a_ξ, a_σ είναι αντίστοιχα οι επιταχύνσεις της ξύλινης σφαίρας και της σιδερένιας σφαίρας θα ισχύει : (α) $a_\xi = 2a_\sigma$ (β) $a_\xi = a_\sigma$ (γ) $2a_\xi = a_\sigma$ (2+4)


(II) Αν t_ξ, t_σ είναι αντίστοιχα οι χρόνοι πτώσης της ξύλινης σφαίρας και της σιδερένιας σφαίρας θα ισχύει : (α) $t_\xi = 2t_\sigma$ (β) $t_\xi = t_\sigma$ (γ) $t_\xi = \sqrt{2} t_\sigma$ (2+4)

57 (12353) Ένας ανελκυστήρας μάζας M μεταφέρει δύο άτομα συνολικής μάζας m . Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Θέλουμε να βρούμε την τάση του (αβαρούς) συρματόσχοινου το οποίο προσδένεται στον ανελκυστήρα. Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο είναι αυτές που ασκούνται από τη γη και το συρματόσχοινο. Η τάση του συρματόσχοινου έχει μέτρο που ισούται με :


(α) Mg (β) $(M-m)g$ (γ) $(M+m)g$

(4+8)


58 (13097) Ο Κώστας και ο Δημήτρης σκέφτηκαν ένα τρόπο για να μετρήσουν τα αντανεκλαστικά τους. Ο Κώστας κρατάει από το πάνω άκρο του ένα χάρακα κατακόρυφο και ο Δημήτρης έχει το χέρι του πιο χαμηλά, κοντά στο χάρακα, χωρίς να τον πιάνει, σε τέτοια θέση ώστε να τον πιάσει και να τον συγκρατήσει μόλις ο Κώστας τον αφήσει ελεύθερο να πέσει. Ο Κώστας άφησε το χάρακα και ο Δημήτρης τον έπιασε, αλλά μέτρησε ότι ώσπου να τον πιάσει ο χάρακας πρόλαβε να πέσει κατακόρυφα κατά $3,2m$. Θεωρώντας ότι το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας στην περιοχή είναι $g = 10m/s^2$ και οι αντιστάσεις του αέρα μπορούν να αγνοηθούν, ο χρόνος αντίδρασης του Δημήτρη είναι : (α) $8s$ (β) $0,8s$ (γ) $0,08s$ (4+8)




59 (13097) Ένας κύβος αρχικά ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο λείο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή $t_0=0$ ασκείται στον κύβο οριζόντια δύναμη F και αρχίζει να κινείται. Τη στιγμή t_1 ο κύβος περνάει σε τραχύ τμήμα του δαπέδου με το οποίο εμφανίζει σταθερή δύναμη τριβής ενώ η δύναμη F εξακολουθεί να ασκείται πάνω του. Το πέρασμα από το λείο στο τραχύ τμήμα του οριζόντιου δαπέδου διαρκεί ασήμαντο χρόνο. Στο διάγραμμα αποδίδεται το μέτρο της ταχύτητας του κύβου με το χρόνο που κινείται. Με τη βοήθεια του διαγράμματος αυτού μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για το μέτρο T της τριβής που δέχεται από το τραχύ δάπεδο και το μέτρο F της οριζόντιας δύναμης που συνεχώς ασκείται πάνω στον κύβο ισχύει :



(α) $T=F$ (β) $T=0,5F$ (γ) $T=0,25F$ (4+9)




60 (13100) Ένας κύβος A μάζας $m_A=m$ βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο και ακλόνητο δάπεδο. Ασκούμε στον κύβο A τρεις οριζόντιες δυνάμεις F_1, F_2 και F_3 . Οι τρεις αυτές δυνάμεις είναι συγγραμμικές με τις F_1, F_3 να έχουν ίδια κατεύθυνση ενώ η F_2 αντίθετη κατεύθυνση από αυτές όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο κύβος A ισορροπεί ακίνητος με την επίδραση αυτών των δυνάμεων (σχήμα 1). Αν κάποια στιγμή καταργηθεί μόνο η δύναμη F_1 ο κύβος A αποκτά επιτάχυνση μέτρου a_1 . Αν ασκήσουμε τη δύναμη F_1 σε έναν άλλο κύβο B μάζας $m_B=2m$ ο οποίος βρίσκεται επίσης πάνω σε λείο οριζόντιο, ακλόνητο δάπεδο και ακίνητος αλλά ελεύθερος να κινηθεί (σχήμα 2), ο κύβος B αποκτά επιτάχυνση μέτρου a_2 . Για τα μέτρα των επιταχύνσεων ισχύει :





(α) $a_1=a_2$ (β) $a_1=2a_2$ (γ) $a_2=2a_1$ (4+9)

61 (13101) Ομάδα μαθητών προσπαθεί να επιβεβαιώσει το νόμο του Hooke εργαστηριακά. Χρησιμοποίησαν ένα αβαρές ελατήριο το οποίο κρέμασαν ώστε να είναι κατακόρυφο στερεώνοντας το πάνω άκρο του σε ακλόνητο σημείο. Δίπλα του στερέωσαν κατακόρυφο ένα υποδεκάμετρο με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνονται οι ενδείξεις του προς τα κάτω όπως φαίνεται στο σχήμα. Κρέμασαν στο κάτω άκρο του ελατηρίου ένα σώμα μάζας m_1 και τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 4cm. Αφαίρεσαν αυτό το σώμα και κρέμασαν στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου ένα δεύτερο σώμα μάζας m_2 διπλάσιας από τη μάζα του πρώτου σώματος ($m_2=2m_1$). Τότε το κάτω άκρο του ελατηρίου ισορρόπησε σε θέση που το υποδεκάμετρο δίπλα του έδειχνε 6cm. Όταν από το κάτω άκρο του ελατηρίου δεν κρέμεται κανένα σώμα, δηλαδή όταν το ελατήριο αποκτήσει το φυσικό του μήκος, το κάτω του θα βρίσκεται σε θέση στην οποία το υποδεκάμετρο δείχνει :




(α) 0 (β) 2cm (γ) 4cm (4+8)

62 (13101) Μικρό σώμα μάζας m κινείται ευθύγραμμα και το διπλανό διάγραμμα δίνει την τιμή της ταχύτητας του σε συνάρτηση με το χρόνο κίνησης. Το διάγραμμα που αποδίδει σωστά την τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα στην κίνηση του αυτή σε σχέση με το χρόνο είναι το :



(4+9)

63 (13102) Ένα βαρύ κιβώτιο μάζας m είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Δένουμε στο κιβώτιο το ένα άκρο ανθεκτικού νήματος, το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στο γερανό όπως στο σχήμα. Ο γερανός σηκώνει το κιβώτιο και το ανεβάζει κατακόρυφα με σταθερή επιτάχυνση a μέτρου $a = \frac{1}{8}g$ όπου g το μέτρο



της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Οι δυνάμεις από τον αέρα μπορούν να αγνοηθούν. Η δύναμη F που ασκείται από το νήμα στο κιβώτιο καθώς το ανεβάζει, έχει μέτρο :

(α) $F=mg$ (β) $F=\frac{9}{8}mg$ (γ) $F=2mg$ (4+8)


64 (13103) Μια ομάδα μαθητών στο εργαστήριο του σχολείου στερεώνει το πάνω άκρο ενός δυναμομέτρου, σε ορθοστάτη. Στη συνέχεια πειραματίζονται κρεμώντας από το γάντζο του βαρίδια με διαφορετικές μάζες. Μετρώντας τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου του δυναμομέτρου, επιβεβαιώνουν ότι υπακούει στο νόμο του Hooke. Στον πίνακα που ακολουθεί, στην 1^η οριζόντια γραμμή δίνονται οι μάζες διαφόρων βαριδιών που κρέμασαν και κάτω από αυτές, οι επιμηκύνσεις του ελατηρίου του δυναμομέτρου σε σχέση με το φυσικό του μήκος. (I) Συμπληρώστε τις τιμές του παρακάτω πίνακα.

Μάζα (g)		100	200		300
Επιμήκυνση ελατηρίου (cm)	4	8		20	




(II) Με τη βοήθεια των τιμών του πίνακα να κάνετε ένα διάγραμμα, σε βαθμολογημένους άξονες, στο οποίο να δείξετε τη γραφική παράσταση της επιμήκυνσης του ελατηρίου (σε cm) από το φυσικό του μήκος, σε συνάρτηση με τη μάζα (σε g) που κρεμούσαν στο άκρο του. (4+8)

65 (13105) Ένα άτυχο σκυλάκι έπεσε στην παγωμένη λίμνη του Κολοράντο της πόλης Lone Tree των Η.Π.Α. Το άτυχο ζώο έμεινε αρκετές ώρες παγιδευμένο αλλά κατάφερε να πλησιάσει το σκυλάκι, το πήρε αγκαλιά και οι συνάδελφοι του άρχισαν να τους τραβούν, με τη βοήθεια σχοινιού που είναι δεμένο στη ζώνη του διασώστη. Η μάζα του διασώστη είναι επτά φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του σκύλου ($m_{\delta}=7m_{\sigma}$). Το σχοινί είναι συνεχώς τεντωμένο και οριζόντιο και ασκεί σταθερή δύναμη στη ζώνη του διασώστη μέτρου $F=80\text{N}$. Η τριβή με την επιφάνεια της παγωμένης λίμνης μπορεί να θεωρηθεί μηδέν και οι αντιστάσεις του αέρα να αγνοηθούν. Το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που ασκεί ο διασώστης στο σκύλο, καθώς τον έχει στην αγκαλιά του έχει μέτρο F_{σ} το οποίο είναι :



(α) $F_{\sigma}=80\text{N}$ (β) $F_{\sigma}=10\text{N}$ (γ) $F=F_{\sigma}=70\text{N}$ (4+9)

66 (13270) Τα αυτοκίνητα Α, Β της εικόνας έχουν ίσες μάζες και κινούνται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου u_0 . Αν το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ακινητοποίηση των αυτοκινήτων Α, Β είναι t_A, t_B αντίστοιχα με $t_A=2t_B$ τότε για τη μέγιστη τιμή του μέτρου της επιβραδύνουσας δύναμης F_A και F_B που μπορεί να αναπτύξει το σύστημα πέδησης των αυτοκινήτων Α, Β αντίστοιχα ισχύει :




(α) $F_B=4F_A$ (β) $F_B=2F_A$ (γ) $F_B=\frac{1}{4}F_A$ (4+9)

67 (13271) Σημειακό αντικείμενο δέχεται την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων ίσου μέτρου F οι φορείς των οποίων σχηματίζουν ανά δύο γωνία $\varphi=120^\circ$. Η συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο : (α) 0 (β) F (γ) $2F$ (4+9)

68 (13272) Σημειακό αντικείμενο μάζας m κινείται ευθύγραμμα και δέχεται την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης ΣF . Η μεταβολή της αλγεβρικής τιμής της ταχύτητας (Δu) του κινητού σε χρονικό διάστημα Δt δίνεται από τη σχέση:

(α) $\Delta u = \frac{\Sigma F}{m} \Delta t$ (β) $\Delta u = \frac{\Sigma F}{m \cdot \Delta t}$ (γ) $\Delta u = \Sigma F \cdot m \cdot \Delta t$ (4+9)

69 (13346) Ένα ιστιοφόρο πλέει με σταθερή ταχύτητα και κατεύθυνση προς το βορρά. Η κατεύθυνση πλεύσης καθορίζεται από την πλάγια δύναμη ($F_{\alpha\epsilon\rho}$) που ασκείται από το δυτικό άνεμο στο φουσκωμένο πανί του και τη δύναμη (F_{κ}) που ασκείται από το νερό στην καρίνα του σκάφους κάθετα



στην κατεύθυνση πλεύσης του. Η δύναμη $F_{\alpha\epsilon\rho}$ είναι σταθερή, έχει μέτρο $F_{\alpha\epsilon\rho}=2 \cdot 10^4 \text{ N}$ και η κατεύθυνση της σχηματίζει γωνία φ με την κατεύθυνση πλεύσης. Για τη γωνία δίνεται ότι $\eta\mu\varphi=0,6$ και $\sigma\upsilon\eta\varphi=0,8$. Το μέτρο της δύναμης F_{κ} την οποία δέχεται η καρίνα του σκάφους από το νερό, κάθετα στην κατεύθυνση πλεύσης είναι :

- (α) $F_{\kappa}=2 \cdot 10^4 \text{ N}$ (β) $F_{\kappa}=1,2 \cdot 10^4 \text{ N}$ (γ) $F_{\kappa}=1,6 \cdot 10^4 \text{ N}$ (4+9)

70 (13464) Σώμα με βάρος $B=100\text{N}$ αφήνεται ελεύθερο από μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της γης ($g=10\text{m/s}^2$). Το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία πέφτει το σώμα είναι $a=4\text{m/s}^2$. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται το σώμα από τον αέρα είναι :


- (α) 60N (β) 40N (γ) 140N (4+9)

71 (13470) Ένα σφαιρίδιο A εκτοξεύεται από την επιφάνεια της γης κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου u_0 . Το σφαιρίδιο φτάνει σε μέγιστο ύψος h από την επιφάνεια της γης σε χρονικό διάστημα Δt_1 . Από το μέγιστο ύψος h στο οποίο φτάνει το σφαιρίδιο A, αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί άλλο σφαιρίδιο B το οποίο φτάνει στην επιφάνεια της γης σε χρονικό διάστημα Δt_2 . Αν αγνοήσουμε και στις δύο περιπτώσεις την αντίσταση του αέρα για τα χρονικά διαστήματα Δt_1 και Δt_2 θα ισχύει :

- (α) $\Delta t_1 < \Delta t_2$ (β) $\Delta t_1 > \Delta t_2$ (γ) $\Delta t_1 = \Delta t_2$ (4+8)

72 (13508) Αγνοώντας την αντίσταση του αέρα, ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων με τις οποίες τα σώματα A και B του διπλανού σχήματος με μάζες m και $2m$ αντίστοιχα φτάνουν στο έδαφος είναι :

- (α) $\frac{u_A}{u_B} = \sqrt{2}$ (β) $\frac{u_A}{u_B} = 1$ (γ) $\frac{u_A}{u_B} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (4+9)




73 (13509) Σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση συνισταμένης δύναμης μέτρου F . Κόβουμε το σώμα σε δύο κομμάτια ίσων μαζών $\frac{1}{2}m$ και στο ένα από αυτά ασκούμε

δύναμη μέτρου $2F$. Η επιτάχυνση a' του κομματιού μάζας $\frac{1}{2}m$ σε σχέση με την επιτάχυνση a του αρχικού σώματος μάζας m είναι :

(α) αυξημένη κατά 100% (β) μειωμένη κατά 300% (γ) αυξημένη κατά 300% (4+8)


74 (13511) Τα σώματα (1), (2) και (3) αποκτούν επιταχύνσεις μέτρων a_1 , a_2 και a_3 αντίστοιχα.



Για τα μέτρα των επιταχύνσεων ισχύει :

(α) $a_2 > a_3 > a_1$ (β) $a_2 > a_1 > a_3$ (γ) $a_1 > a_2 > a_3$ (4+8)

75 (13512) Το σώμα του παρακάτω σχήματος κινείται προς τα αριστερά πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα u . Τη χρονική στιγμή $t_0=0$ ασκούνται στο σώμα ταυτόχρονα δύο οριζόντιες δυνάμεις F_1 και F_2 ($F_1 > F_2$).




Κάποια χρονική στιγμή $t > t_0$ και ενώ το σώμα εξακολουθεί να κινείται προς τα αριστερά καταργούμε τη δύναμη F_2 , οπότε :

(α) το σώμα θα αρχίσει να κινείται προς τα δεξιά.

(β) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος θα μειώνεται πιο γρήγορα.

(γ) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος θα αρχίζει να αυξάνεται. (4+8)

76 (13512) Τη χρονική στιγμή $t_0=0$ το κιβώτιο του σχήματος μάζας $m=10\text{kg}$ έχει ταχύτητα $u_0=2\text{m/s}$. Το μέτρο της ταχύτητας του κιβωτίου μειώνεται στο μισό αφού αυτό μετατοπιστεί κατά $\Delta x=0,1\text{m}$.




Η μείωση της ταχύτητας του κιβωτίου για τη συγκεκριμένη μετατόπιση Δx οφείλεται στο γεγονός ότι στο κιβώτιο ασκείται :

(α) δύναμη μέτρου $F=75\text{N}$ αντίρροπη της ταχύτητας.

(β) τριβή ολίσθησης μέτρου $T_{ρ(ολ)}=150\text{N}$ και δύναμη $F=75\text{N}$ ομόρροπη της ταχύτητας.

(γ) δύναμη μέτρου $F=75\text{N}$ αντίρροπη της ταχύτητας και τριβή ολίσθησης μέτρου $T_{ολ}=75\text{N}$. (4+9)

81 (13553) Ένα σώμα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Κάποια στιγμή στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F και το σώμα αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά. Το μέτρο της επιβράδυνσης αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο κίνησης. Η γραφική παράσταση του μέτρου της δύναμης (F) που ασκείται στο σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο (t) δίνεται από το διάγραμμα:




I

II

III

(4+9)

82 (13555) Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκείται πάνω του οριζόντια δύναμη, σταθερής διεύθυνσης, που η τιμή της σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από το διπλανό διάγραμμα.




Επομένως :

- (α) στο χρονικό διάστημα (15-20)s το σώμα επιβραδύνεται γιατί η δύναμη που του ασκείται είναι μικρότερη από τη δύναμη που του ασκείται στο χρονικό διάστημα (5-15)s.
 (β) στο χρονικό διάστημα (5-15)s το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα.
 (γ) σε όλο το χρονικό διάστημα (0-20)s η ταχύτητα του σώματος συνεχώς αυξάνεται. (4+9)

83 (13566) Ένας ανελκυστήρας μάζας 350kg μεταφέρει δύο άτομα συνολικής μάζας 150kg. Ο ανελκυστήρας ξεκίνησε από την ηρεμία τη χρονική στιγμή $t_0=0$ και άρχισε να ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση. Για το χρονικό διάστημα (0-10)s η ταχύτητα του μεταβλήθηκε κατά 2m/s. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα, ότι οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο του είναι αυτές που ασκούνται από τη γη, συρματόσχοινο, ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή $g=10\text{m/s}^2$ τότε η δύναμη που ασκεί το (αβαρές) συρματόσχοινο στο οποίο είναι προσδεμένος ο ανελκυστήρας έχει τιμή :

- (α) 5000N (β) 5100N (γ) 5150N (4+9)


84 (13566) Δυο κιβώτια A, B βρίσκονται δίπλα-δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκούνται και στα δύο κιβώτια A, B σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F_A , F_B με μέτρα $F_A=3F_B$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα.



Αν τη χρονική $t_1=10\text{s}$ η ταχύτητα του κιβωτίου A είναι u . Το κιβώτιο B αποκτά ταχύτητα ίδιου μέτρου u τη χρονική στιγμή $t=20\text{s}$. Οι μάζες των δύο κιβωτίων θα συνδέονται με τη σχέση :


- (α) $m_A=m_B$ (β) $m_A=\frac{2}{3}m_B$ (γ) $m_B=\frac{2}{3}m_A$ (4+9)

85 (13568) Δυο κιβώτια A, B βρίσκονται δίπλα-δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκούνται και στα δύο κιβώτια A, B σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F_A, F_B με μέτρα $F_A=3F_B$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Αν τη χρονική $t_1=10s$ η ταχύτητα του κιβωτίου A είναι διπλάσια από την ταχύτητα του κιβωτίου B τότε οι μάζες των δύο κιβωτίων θα συνδέονται με τη σχέση :



(α) $m_A=m_B$ (β) $m_A=\frac{2}{3} m_B$ (γ) $m_B=\frac{2}{3} m_A$ (4+9)

86 (13569) Δυο κιβώτια A, B βρίσκονται δίπλα-δίπλα και ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή $t=0$ ασκούνται και στα δύο κιβώτια A, B σταθερές οριζόντιες δυνάμεις F_A, F_B με μέτρα $F_A=3F_B$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δυο κιβώτια αρχίζουν να κινούνται ευθύγραμμα στο οριζόντιο επίπεδο και η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. Αν τη χρονική $t_1=10s$ το κιβώτιο B έχει διανύσει τριπλάσια απόσταση από το κιβώτιο A τότε οι μάζες των δύο κιβωτίων θα συνδέονται με τη σχέση :




(α) $m_A=m_B$ (β) $m_A=9m_B$ (γ) $m_B=\frac{1}{3} m_A$ (4+9)

87 (13571) Σφαίρα μάζας $m=10kg$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα μέσω ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή $g=10m/s^2$ συνδυάστε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την 1^η στήλη με την κατάλληλη τιμή τάσης της 2^{ης} στήλης.

κίνηση	τάση νήματος
προς τα πάνω με επιτάχυνση $\frac{1}{3} g$	0
προς τα κάτω με επιτάχυνση g	50N
προς τα πάνω με επιβράδυνση $\frac{1}{2} g$	100N
προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα	150N
	200N

(4+8)

88 (13572) Τρία ακίνητα σώματα A, B και Γ με διαφορετικές μάζες δέχονται την ίδια συνισταμένη δύναμη F και ξεκινούν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Το διάγραμμα παρουσιάζει τις μεταβολές των ταχυτήτων τους ως προς το χρόνο για το χρονικό διάστημα που το καθένα δέχεται δύναμη. Η σχέση των μαζών των σωμάτων είναι :



(α) $m_A=m_B=m_\Gamma$ (β) $m_A < m_B < m_\Gamma$ (γ) $m_A > m_B > m_\Gamma$ (4+8)

89 (13576) Σφαίρα μάζας $m=10\text{kg}$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα μέσω ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή $g=10\text{m/s}^2$ συνδυάστε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την 1^η στήλη με την κατάλληλη τιμή τάσης της 2^{ης} στήλης.

κίνηση	τάση νήματος
προς τα πάνω με επιτάχυνση $\frac{1}{4}g$	0
προς τα κάτω με επιτάχυνση g	50N
προς τα πάνω με επιβράδυνση $\frac{1}{2}g$	100N
προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα	125N
	200N

(4+8)

90 (13577) Σφαίρα μάζας $m=2\text{kg}$ κρέμεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα μέσω ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος. Αν η αντίσταση του αέρα μπορεί να θεωρηθεί ως μια σταθερή δύναμη μέτρου 10N που έχει πάντα αντίθετη φορά από τη φορά κίνησης της σφαίρας και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή $g=10\text{m/s}^2$ συνδυάστε κάθε είδος κίνησης του ανελκυστήρα από την 1^η στήλη με την κατάλληλη τιμή τάσης της 2^{ης} στήλης.

κίνηση	τάση νήματος
προς τα πάνω με επιτάχυνση $\frac{3}{4}g$	0
προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα	10N
προς τα κάτω με επιτάχυνση $\frac{1}{2}g$	15N
προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα	30N
	45N

(4+9)

91 (13578) Ένας ανελκυστήρας μάζας 5m μεταφέρει δύο άτομα μάζας m ο καθένας. Αρχικά ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Μετά από μία στάση σε έναν όροφο και αφότου κατέβει ο ένας επιβάτης ο ανελκυστήρας συνεχίζει να ανεβαίνει διατηρώντας σταθερή την τάση του (αβαρούς και άκαμπτου) συρματόσχοινου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα, ότι οι μοναδικές δυνάμεις που δέχεται ο θάλαμος του ανελκυστήρα κατά την άνοδο του είναι αυτές που ασκούνται από τη γη, συρματόσχοινο, ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή $g=10\text{m/s}^2$ τότε η επιτάχυνση με την οποία κινείται ο ανελκυστήρας όταν μέσα υπάρχει ένας επιβάτης έχει τιμή :


(α) $\frac{5}{3}\text{m/s}^2$

(β) $\frac{8}{3}\text{m/s}^2$

(γ) $\frac{10}{3}\text{m/s}^2$

(4+8)

92 (13614) Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το ανώτερο άκρο του ακλόνητα στερεωμένο. Δένουμε στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου σώμα μάζας m και το σύστημα ισορροπεί σε θέση όπου το ελατήριο έχει επιμήκυνση $\Delta\ell$. Αν στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου συνδέσουμε σώμα μάζας $2m$ το σύστημα θα ισορροπεί σε θέση όπου το ελατήριο θα έχει επιμήκυνση




(α) $\Delta\ell$

(β) $2\Delta\ell$

(γ) $\frac{1}{2}\Delta\ell$

(4+8)

93 (13617) Σημειακό αντικείμενο μάζας $m=1\text{kg}$ κινείται ευθύγραμμα. Η συνισταμένη των δυνάμεων που του ασκούνται μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο διπλανό διάγραμμα. Τη χρονική στιγμή $t_0=0$ η ταχύτητα του σώματος είναι $u_0=0$.




(I) Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα.

t (s)	2	4	6	8	10	12	14
v ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$)							

(II) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για τη χρονική στιγμή $t=10\text{s}$.

(7+5)

94 (93618) Σημειακό αντικείμενο μάζας $m=1\text{kg}$ κινείται ευθύγραμμα. Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο διπλανό διάγραμμα.



(I) Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα.

t (s)	2	4	6	10	12	14
$\sum F$ (N)						

(II) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για τη χρονική στιγμή $t=10\text{s}$.

(6+6)


95 (13620) Σημειακό αντικείμενο A μάζας m κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης ΣF . Σημειακό αντικείμενο B μάζας $2m$ κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης ΣF . Αν Δu_A είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου A σε χρονικό διάστημα Δt και Δu_B είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου B σε χρονικό διάστημα $2\Delta t$ τότε :

(α) $\Delta u_A = \Delta u_B$ (β) $\Delta u_A = 2\Delta u_B$ (γ) $\Delta u_A = \frac{1}{2}\Delta u_B$ (4+9)

96 (13622) Σημειακό αντικείμενο A μάζας m κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης ΣF . Σημειακό αντικείμενο B μάζας m κινείται ευθύγραμμα με την επίδραση σταθερής συνισταμένης δύναμης $2\Sigma F$. Αν Δu_A είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου A σε χρονικό διάστημα Δt και Δu_B είναι η μεταβολή της ταχύτητας του σημειακού αντικειμένου B σε χρονικό διάστημα $2\Delta t$ τότε :

(α) $\Delta u_A = \Delta u_B$ (β) $\Delta u_A = 4\Delta u_B$ (γ) $\Delta u_A = \frac{1}{4}\Delta u_B$ (4+9)

97 (13657) Στην εικόνα παρουσιάζεται ένα ελατήριο που στην ελεύθερη άκρη του υπάρχει σώμα μικρής μάζας m . Το ελατήριο ταλαντώνεται οριζοντίως σε λείο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή (1) απεικονίζεται ο ελατήριο συσπειρωμένο, τη χρονική στιγμή (2) βρίσκεται στο φυσικό του μήκος και τη χρονική στιγμή (3) είναι επιμηκυμένο. Η δύναμη του ελατηρίου έχει σχεδιαστεί σωστά στο σχήμα :




(4+8)

98 (13770) Ο αστροναύτης Dave Scott στην αποστολή του Apollo 15 ρίχνει ένα σφυρί και ένα φτερό στην επιφάνεια της σελήνης, η οποία δεν έχει ατμόσφαιρα, για να επιβεβαιώσει το νόμο της ελεύθερης πτώσης. Πράγματι το πείραμα επιβεβαίωσε ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκιο «όλα τα σώματα όταν αφεθούν από κάποιο ύψος να πέσουν ελεύθερα, φτάνουν στο έδαφος ταυτόχρονα». Έστω ότι αφήνετε να πέσει ελεύθερα και εσείς ένα πανομοιότυπο σφυρί με αυτό που άφησε ο Scott στη σελήνη. Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στη γη (g_T) και η επιτάχυνση της βαρύτητας στη σελήνη (g_S) συνδέονται με τη σχέση $g_T = 6g_S$. Αν εσείς αφήνατε το σφυρί να πέσει στη γη από ύψος h_1 από την επιφάνεια του εδάφους, τότε το ύψος h_2 από την επιφάνεια της σελήνης από το οποίο θα έπρεπε να αφήσει ο αστροναύτης το σφυρί έτσι ώστε οι χρόνοι πτώσης στη γη και στη σελήνη να είναι ίδιοι θα ήταν :

(α) $h_1 = \sqrt{6} h_2$ (β) $h_1 = 6h_2$ (γ) $h_1 = h_2$ (4+8)

99 (13771) Στην παρακάτω γραφική παράσταση περιγράφεται η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο ενός σώματος το οποίο αφέθηκε να πέσει από ύψος h πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Το σώμα προσκρούει στο έδαφος $5s$ αργότερα.




Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δεδομένα από τη γραφική παράσταση, η καλύτερη εκτίμηση για το ύψος πτώσης είναι :

- (α) μεταξύ 57m και 63m
- (β) μεταξύ 63m και 66m
- (γ) μεταξύ 123m και 126m

(4+9)

100 (13772) Δύο μαθητές της Α λυκείου πειραματίζονται στην ελεύθερη πτώση. Σε κάποιο από τα πειράματά τους επιλέγουν να αφήσουν ελεύθερα ένα κομμάτι μάρμαρο (M) και ένα κομμάτι ξύλο (Ξ) από το μπαλκόνι του 1^{ου} ορόφου του σχολείου τους. Το μάρμαρο και το ξύλο έχουν το ίδιο σχήμα (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο) και ίδιο όγκο. Ο Νίκος τοποθετεί το μάρμαρο πάνω στο ξύλο και αφήνει τα σώματα να πέσουν ενώ η Αγγελική βρίσκεται στο προαύλιο και παρατηρεί ότι τα σώματα φτάνουν στο προαύλιο και σε κανένα σημείο της τροχιάς τους δεν παρατηρείται απομάκρυνση του ενός από το άλλο. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα η δύναμη που ασκεί το μάρμαρο στο ξύλο κατά την πτώση είναι :



- (α) ομόρροπη με την ταχύτητα
- (β) μηδέν
- (γ) αντίρροπη με την ταχύτητα

(4+9)